

Памятка

Полиомиелит — острое, высококонтагиозное инфекционное заболевание, обусловленное поражением спинного мозга полиовирусом (кишечный вирус) и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы.

Источник инфекции — человек (больной или переносящий заражение бессимптомно). Воздушно-капельным путём. Возбудитель выделяется в окружающую среду через рот в течение нескольких суток, а затем с испражнениями в течение длительного периода - от нескольких недель до нескольких месяцев.

Заражение может произойти воздушно-капельным путём, но чаще — при попадании вируса в рот через загрязнённые руки, пищу, (орехи и плохо промытые и приготовленные сухофрукты), воду.

Клинически полиомиелит проявляется повышением температуры, головными и мышечными болями с последующим развитием параличей.

В 30% случаев полиомиелит заканчивается инвалидностью, в 30% - более легкими осложнениями. Полное выздоровление без последствий наступает в 30% случаев, в 10% - смерть.

Главную роль в профилактике полиомиелита играет вакцинация!

Иммунизация против полиомиелита проводится в соответствие с Национальным календарем профилактических прививок детям до 15 лет, начиная с 3-месячного возраста, несколько раз по определённой схеме, с интервалами в 45 дней и более. Первые две прививки проводят инактивированной вакциной, последующие – живой ослабленной вакциной - через рот, в виде капель.

Для получения вакцинации против полиомиелита приглашаем Вас с ребенком в детскую поликлинику по месту жительства!

Сделайте Вашему ребенку вакцинацию от полиомиелита, защитите его от тяжелой болезни!